

**Foliar calcium treatment for
apples**

**Traitement foliaire au calcium
pour les pommes**

Caltrac 400

Guaranteed analysis:

Analyse garantie:

Calcium (Ca) (actual/réel) 23,7%

See back of pack for further information

Voir au verso pour de plus amples renseignements

**Contents
Contenu**

10 litres

**Net weight
Poids net**

16.79 kg

Made in the U.K./fabriqué aux R.U. PHOSYN plc, Pocklington, York YO42 1DN

LCA1561

Caltrac 400

FOLIAR DOSE RATES AND TIMINGS

Apples: Repeat applications of 3 to 4 l/ha from petal fall up to one month before harvest. A single application of up to 10 l/ha may be made from petal fall to just after 'June drop'. Minimum water rate: 300 l/ha.

Ginseng: 5 l/ha once new season growth is underway. Repeat if necessary at 10 to 14 day intervals. Water rate: 500 l/ha.

Peppers, Tomatoes (field grown): 1 to 4 applications of 5 l/ha from flowering on second truss onwards up to one month before harvest. Allow 7 days between applications. Water rate: 500 l/ha.

Potatoes: 2 to 3 applications of 5 l/ha commencing at tuber initiation (when 50% of the tip swellings are twice the diameter of the rest of the stolon) and following petiole analysis during tuber bulking with 10 to 14 day intervals between applications. Water rate: 200 l/ha.

Tobacco: 5 l/ha applied 2 to 3 weeks after transplanting (3 to 4 leaf stage) and again 10 days later. Water rate: 200 l/ha.

INSTRUCTIONS FOR USE

Shake the container thoroughly before use. Pour through the top filter into the tank three-quarters filled with water, whilst agitating. Top up with water and continue to agitate until spraying is completed.

COMPATIBILITY

PHOSYN products are physically compatible with many agrochemicals. *Contact your Distributor for information.*

STORAGE

Keep in a cool, dry chemical store, out of reach of children and livestock. *Protect from frost.*

PRECAUTIONS

Avoid application under extremes of climate, e.g. rapid drying conditions, extremely slow drying conditions, frost, rain, or when frost or rain are anticipated. Avoid contact with the product. Wear suitable gloves and faceshield when handling concentrate. Clean all equipment before and after use.

NOTE

For use only as described on this label or in concurrent written instructions from the manufacturer. All other use is at the purchaser's risk.

Not for application to crops under glass or polythene.

This product is subject to the terms and conditions of sale of the company, available on request.
26.03.02 - replaces all previous labels.

Caltrac 400

APPLICATION FOLIAIRE - DOSES ET STADES

Ginseng: 5 l/ha dès que la pousse de l'année est bien développée. Répéter si nécessaire à 10 à jours d'intervalle. Volume d'eau: 500 l/ha.

Poivrons, Tomates (plein champ): 1 à 4 applications de 5 l/ha de la floraison du deuxième bouquet jusqu'à 1 mois avant récolte. Laisser 7 jours entre applications successives. Volume d'eau: 500 l/ha.

Pommes de Terre: 2 à 3 applications de 5 l/ha à partir de l'initiation des tubercules (quand 50% des stolons se sont gonflés à 2 fois leur diamètre normal) et pendant le grossissement suite à l'analyse pétioleaire. Laisser 10 à 14 jours entre applications successives. Volume d'eau: 200 l/ha.

Pommiers: Application répétées de 3 à 4 l/ha de la chute des pétales jusqu'à 1 mois avant cueillette. Une seule application de jusqu'à 10 l/ha peut être effectuée du stade chute des pétales jusqu'à la chute physiologique (de juin). Volume d'eau minimum: 300 l/ha.

Tabac: 5 l/ha appliqués 2 à 3 semaines après le repiquage (stade 3 à 4 feuilles) et 10 jours plus tard. Volume d'eau: 200 l/ha.

MODE D'EMPLOI

Secouer le bidon et verser le produit à travers un filtre dans la cuve remplie au trois-quarts d'eau. L'agitateur doit être en fonctionnement pendant cette opération. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

COMPATIBILITE

Les produits PHOSYN sont compatibles physiquement avec un grand nombre de pesticides. *Pour tout renseignement, consulter votre Distributeur.*

ENTREPOSAGE

Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et hors de la portée des enfants et des animaux.

PRECAUTIONS

Eviter les applications par des conditions climatiques extrêmes, ex. rapidité de séchage, séchage extrêmement lent, gelée, pluie, ou lorsque la gelée ou la pluie est prévue. Eviter le contact avec le produit. Porter un masque et des gants appropriés lors de la manutention des concentrés. Nettoyer tout équipement avant et après utilisation.

NOTE

A n'utiliser qu'en accord avec cette étiquette ou suite au instructions écrites, concordantes du fabricant. Tout autre usage au risque du client.

Ne pas appliquer sur cultures sous serre ou sous plastique. Ce produit est sujet aux termes et conditions de vente de la société, disponibles sur demande.

26.03.02 - remplace toutes étiquettes précédentes.